

Patientkort

- Bär alltid med dig ditt patientkort och visa det för all hälso- och sjukvårdspersonal som du konsulterar (t.ex. om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).
- Patientkortet påminner dig om de viktigaste symtomen som genast måste rapporteras till läkare/sjuksköterska. Det innehåller också kontaktuppgifterna till din behandlande läkare och informerar övrig hälso- och sjukvårdspersonal om att du behandlas med YERVOY®.
- Vårdpersonalen som behandlar dig med YERVOY® ska fylla i avsnittet "Kontaktuppgifter till min läkare" i patientkortet och även fylla i läkarens kontaktuppgifter nedan.



Kontaktuppgifter till min läkare (som ordinerade YERVOY®)

Läkarens namn:

Telefon under kontorstid:

Telefon efter kontorstid:



För mer information läs bipacksedeln för
YERVOY® på www.fass.se och www.ema.europa.eu
eller ring Medicinsk Information på 08-585 07 304

YERVOY® (ipilimumab)

Patientguide

Om du har ordinerats YERVOY® ensamt
→ Läs den här guiden och patientkortet för YERVOY® (ipilimumab).

Om du har ordinerats YERVOY® i kombination med OPDIVO®
→ Läs istället patientkortet för OPDIVO® (nivolumab).

Introduktion

- Den här guiden ger dig information om behandling med YERVOY® och beskriver eventuella tecken och symtom på biverkningar som du kan uppleva.
- Den innehåller också viktiga råd om vad du ska göra om du upplever tecken eller symtom för att säkerställa att de inte förvärras och att du får behandling så snabbt och effektivt som möjligt.
- YERVOY® kan orsaka allvarliga biverkningar i olika delar av kroppen som behöver behandlas omedelbart, oberoende av svårighetsgrad, för att undvika att de blir värre.
- **I den här guiden ingår ett patientkort.** Kom ihåg att alltid bära med dig ditt patientkort och visa det för all hälso- och sjukvårdspersonal som du konsulterar (t.ex. om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).
- Mer information om YERVOY® finns i bipacksedeln.

Vad du ska kontrollera med din läkare före behandlingen



Innan du inleder behandlingen ska du informera din läkare om eventuell tidigare behandling du fått och eventuella sjukdomar du har eller har haft.

Dessutom kontrollerar din läkare följande före behandlingen:

- om du tar kortikosteroider eller annan behandling som påverkar immunsystemet
- om du tar några läkemedel som hindrar blodet från att levera sig (antikoagulerande medel)
- din leverfunktion
- din sköldkörtelfunktion
- om du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen attackerar sina egna celler)
- om du har, eller har haft, en kronisk virusinfektion i levern, såsom:
 - hepatit B (HBV)
 - hepatit C (HCV)
- om du har en infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid
- ditt allmäntillstånd för att kunna avgöra om du är lämplig för behandlingen.

Biverkningar av behandlingen

YERVOY® aktiverar ditt immunsystem att bekämpa cancerceller. Det finns en risk att ditt aktiverade immunsystem kan skada friska celler i kroppen, vilket kan orsaka biverkningar som kan vara allvarliga eller livshotande. Tecken och symtom på biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen eller upp till flera månader efter att behandlingen avslutats.

Vad du ska göra om du misstänker en biverkning:

- Ring **omedelbart** din läkare om du får tecken eller symtom eller om de inte går över eller om de blir värre. Tecken och symtom som kan verka lindriga kan snabbt bli värre om de inte behandlas.
- Behandla **INTE** tecken och symtom själv.
- Känd dig **INTE** obekvämt och oroa dig inte för att störa din läkare.

Observera:

- Följande tecken och symtom inkluderar inte alla eventuella tecken och symtom på biverkningar som kan uppkomma vid behandling med YERVOY®.
- En del tecken och/eller symtom som förekommer i en del av kroppen kan stå i samband med en biverkning i en annan del av kroppen (t.ex. gul hud kan vara ett tecken på leverproblem).

Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att behandlingen med YERVOY® tillfälligt eller permanent måste avbrytas och möjliggör att du kan få ut maximal effekt av behandlingen.

Eventuella biverkningar



MAGE OCH TARM

- diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), blodig eller mörkfärgad avföring
- fler tarmtömningar än vanligt
- smärta eller ömhet i mage eller buk, illamående, kräkningar



ÖGON

- röda ögon
- ögonsmärta
- synproblem eller dimsyn



LEVER

- guldfärgade ögon eller hud (gulsot)
- smärta på höger sida i magtrakten
- mörk urin



NERVER

- muskelsvaghet
- domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte
- yrsel, medvetlöshet eller svårigheter att vakna



HUD

- hudutslag med eller utan klåda, torr hud
- blåsor och/eller flagnande hud, munsår
- svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna



ÖVRIGT

- feber, huvudvärk, trötthet
- blödningar
- beteendeförändringar (t.ex. minskad sexuell lust, irritation eller glömska)
- vätskebrist, lågt blodtryck, chock

Andra viktiga biverkningar:

Svåra infusionsreaktioner

- Reaktionen på infusion av YERVOY® kan förekomma, vanligen under eller inom 24 timmar efter infusionen.
- **Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du får dessa symtom under en infusion av YERVOY®: frossa eller skakningar, klåda eller utslag, rodnad, andningssvårigheter, yrsel, feber och känsla av svimfärdighet.**