

Kontaktuppgifter till min läkare

(som förskrivit YERVOY®)

Läkarens namn:

Telefonnummer under kontorstid:

Telefonnummer efter kontorstid:

Mina kontaktuppgifter

Mitt namn och mitt telefonnummer:

Kontaktinformation vid en nödsituation (namn och telefonnummer):

VIKTIG information för hälso- och sjukvårdspersonal



- Denna patient behandlas med YERVOY® ensamt.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är av görande för att minimera livshotande komplikationer.

- Konsultation av en onkolog eller övrig specialist kan vara till hjälp vid hantering av organspecifika immunrelaterade biverkningar.
- Hälso- och sjukvårdspersonal kan hitta mer information i produktresumén för YERVOY® som finns på www.fass.se och www.ema.europa.eu eller ringa Medicinsk Information på 08-585 07 304 för mer information.



Hälso- och sjukvårdspersonalen som behandlar patienten med YERVOY® ska fylla i avsnittet "Kontaktuppgifter till min läkare" i detta Patientkort.

YERVOY® (ipilimumab)

Patientkort

Granskat av Läkemedelsverket: oktober 2021
Lokalt referensnummer: 731-SE-2100001



YERVOY® (ipilimumab)

Viktig information för patienter

Bär alltid det här kortet
med dig för att informera
hälso- och sjukvårdspersonal
om att du behandlas med
YERVOY® ensamt.

Om du får tecken
eller symtom, tala genast
om det för din läkare.



Eventuella biverkningar



MAGE OCH TARM

- diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), blodig eller mörkfärgad avföring
- fler tarmtömningar än vanligt
- smärta eller ömhet i mage eller buk, illamående, kräkningar



LEVER

- guldfärgade ögon eller hud (gulsot)
- smärta på höger sida i magtrakten
- mörk urin



HUD

- hudutslag med eller utan klåda, torr hud
- blåsor och/eller flagnande hud, munsår
- svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna



ÖGON

- röda ögon
- ögonsmärta
- synproblem eller dimsyn



NERVER

- muskelsvaghet
- domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte
- yrsel, medvetslöshet eller svårigheter att vakna



ÖVRIGT

- feber, huvudvärk, trötthet
- blödningar
- beteendeförändringar (t.ex. minskad sexuell lust, irritation eller glömska)
- vätskebrist, lågt blodtryck, chock



VIKTIGT

- Berätta för din läkare om alla tidigare sjukdomar.
- Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att behandlingen med YERVOY® tillfälligt eller permanent måste avbrytas.
- Tecken och symtom som kan verka lindriga kan snabbt bli värre om de inte behandlas.
- Försök INTE behandla dessa symtom själv.



VIKTIGT

- Tecken och symtom kan vara fördröjda och kan uppkomma veckor till månader efter din sista YERVOY®-infusion.

För mer information läs bipacksedeln
för YERVOY® på www.fass.se eller
www.ema.europa.eu